



Profilassi

- Epatiti virali
- Tifo
- Poliomielite
- Tubercolosi

EPATITE A

- **Norme comportamentali**

Evitare cibi e acqua potenzialmente contaminati: non si deve bere acqua non sicura e bevande con ghiaccio né mangiare frutti di mare crudi, verdure crude.

- **Immunoprofilassi attiva**

Vaccino anti-epatite A preparato con virus inattivato, somministrazione I.M (due dosi).

Si ottiene una protezione già dopo 20-30 giorni circa dalla somministrazione di una singola dose. Una dose di richiamo somministrata dopo 6-12 mesi conferisce una protezione per oltre 10 anni .

How hepatitis is spread



INFECTION SOURCE

TRANSMISSION PROBABILITIES

B B virus **C** C virus

Definitely Rarely Suspected

Between family members	B		C
Job exposure to blood	B C		
Needle-stick injuries	B C		
IV drug use (shared needles)	B C		
Transfusions	B C		
Hemodialysis	B C		
Orally		B C	
Sexually	B	C	
Anal/oral sex	B		C
Mother to child at birth	B		C
Body piercing	B C		
Acupuncture/tattooing	B C		
Recreational cocaine	B C		



EPATITE B

- Norme comportamentali
- Immunoprofilassi attiva

Vaccino anti-epatite B somministrazione I.M. (tre dosi).

1° dose tempo 0;

2° dose dopo un mese;

3° dose dopo sei mesi.

Non si ha un'ottima protezione finche non si è completato la vaccinazione.

EPATITE C

- Norme comportamentali

Non esiste nessun vaccino

TIFO

- **Norme comportamentali**

Corretta igiene personale; evitare l'ingestione di cibi potenzialmente infetti, derivati da sorgenti animali, specie maiale, pollame, prodotti derivati da uova; evitare di consumare uova crude o non completamente cotte; lavaggio delle mani prima, durante e dopo la manipolazione dei cibi.

- **Immunoprofilassi attiva**

Un vaccino da somministrare per via intramuscolare (una sola dose con richiami ogni 2-3 anni). Il vaccino conferisce efficacia protettiva 7 giorni dopo l'iniezione.

Un vaccino somministrato per via orale (4 compresse a giorni alterni). Le compresse vanno conservate in frigorifero e assunte ad un'ora di distanza dai pasti. La protezione inizia circa 10 giorni dall'assunzione dell'ultima compressa e persiste per circa 5 anni.

POLIOMIELITE

- **Norme comportamentali**

Evitare cibi e acqua potenzialmente contaminati e igiene personale

- **Immunoprofilassi attiva**

Vaccino “inattivato” di Salk (IPV), da somministrare con iniezione intramuscolo.

Vaccino “vivo attenuato” di Sabin (OPV), da somministrare per via orale.

Nell'età adulta l'immunizzazione con IPV (ciclo completo o richiamo) è indicata in occasione di soggiorni in zone rurali di paesi ove ancora esiste il rischio della poliomielite.

TUBERCOLOSI

- **Norme comportamentali**

Evitare i contatti con persone affette da TBC polmonare.

Nel caso di contatto indossare sempre mascherina

- **Immunoprofilassi attiva**

Il vaccino ha una copertura molto bassa